



# วัคซีนไข้เลือดออก




มี 2 ชนิด

เป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์

ชนิดที่ 1

วัคซีนที่มีแกนหลัก  
เป็นไวรัสไข้เหลือง


65%



ชนิดที่ 2

วัคซีนที่มีแกนหลัก  
เป็นไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2

80%



โปรดปรึกษาแพทย์  
เพื่อขอคำแนะนำ  
การรับวัคซีน



ประสิทธิภาพในการป้องกัน  
ไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์



ประสิทธิภาพในการป้องกัน  
ไข้เลือดออกที่ต้องนอนโรงพยาบาล

80%



90%





# คำแนะนำการรับวัคซีนไข้เลือดออก

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย



วัคซีนไข้เลือดออก  
ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสไข้เหลือง



\*เฉพาะสำหรับผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน จากประวัติ ผลการตรวจ  
ยืนยันหรือตรวจเลือดพบว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น



วัคซีนไข้เลือดออก  
ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2



\*ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยติดเชื้อและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

สำหรับผู้ที่หายจากไข้เลือดออกแล้ว  
ถ้าต้องการรับวัคซีนไข้เลือดออก  
ให้รับวัคซีนหลังจากเป็นไข้เลือดออกแล้ว  
**อย่างน้อย 6 เดือน**

#### ข้อห้ามใช้

ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ได้รับความผิดปกติ  
เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน หรือมีการติดเชื้อเอชไอวี  
ระยะที่มีอาการ หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

**โปรดปรึกษาแพทย์  
เพื่อขอคำแนะนำ  
การรับวัคซีน**

