



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ

## วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี)



### HPV มี 2 ชนิด

- 1. ชนิด 2 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- 2. ชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่

วัคซีนทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ไม่แตกต่างกัน



แนะนำให้ให้นักเรียนหญิง ชั้น ป.5 รับวัคซีน



โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน



### กระทรวงสาธารณสุข

เสนอวัคซีนเอชพีวี เข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติ

### กระทรวงสาธารณสุข

ต่อรองราคา การซื้อวัคซีน


ให้ประหยัดงบประมาณรวมกว่า

**36.8**  
ล้านบาท



แต่การตรวจคัดกรอง ไม่ได้ช่วยป้องกัน  
จากโรคมะเร็งปากมดลูก

การป้องกันสามารถทำได้โดย  
ฉีดวัคซีน HPV



สามารถป้องกันได้ถึง  
70 - 80 %



## มะเร็งปากมดลูก

สาเหตุ



ติด เชื้อไวรัส HPV หรือเชื้อ ไวรัสหูด  
ที่บริเวณปากมดลูก

อาการ

ตกเลือดทางช่องคลอด มีเลือดออกกะปริบกะปรอยผิดปกติ

อาการหลังจากมะเร็งลุกลามสู่วัยวะอื่น



ขาบวม



ปวดกันγκ



ปวดหลัง



ปัสสาวะ  
อุจจาระเป็นเลือด

เสียชีวิต

ปัจจัย

- ✗ มีคู่นอนหลายคน
- ✗ เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ✗ มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

การป้องกัน

- ✓ หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน
- ✓ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี
- ✓ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV