



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ใน โรงพยาบาล



ข้อมูล : 22 ส.ค. 66

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน


สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# มาตรการเฝ้าระวังโรค

◆ **หากมีอาการ\*** [ไข้สูงเกิน 2 วัน อาเจียน อ่อนเพลีย มีผื่นแดง]



- **รับการตรวจวินิจฉัยทันที**
- **หยุดปฏิบัติงาน ป้องกันการแพร่เชื้อ**



◆ **ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น**

- แอสไพริน
- ไอบูโพรเฟน
- ไดโคลฟีแนค



# มาตรการป้องกันโรค



- **สำรวจ/ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
ในบ้านพักเจ้าหน้าที่**



- **หอพักผู้ป่วย ให้มีมุ้งลวด/มุ้งตาข่าย**

- **งดใช้แจกันใส่น้ำปลูกต้นไม้**




- **ทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำ  
ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**

- **แจกยาทาป้องกันยุงเจ้าหน้าที่และ  
ผู้มารับบริการ**



# มาตรการควบคุมโรค

◆ **พบผู้ป่วย** : แจ้งสถานบริการสาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



◆ **กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง** : ทุกสัปดาห์ ไม่ให้มี แหล่งเพาะพันธุ์ในรพ.

◆ **เจ้าหน้าที่** : ควรทากันยุง



◆ **สื่อสารความเสี่ยง** : ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ป้องกันตนเองไม่ให้ ถูกยุงกัด

