



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ฝีดาษวานร
(Mpox)
ใครเสี่ยง





อาการ



โรคฝีดาษวานร (Mpox)



ไข้



ปวดหัว



ผื่น/ตุ่ม




ต่อมน้ำเหลืองโต



ปวดกล้ามเนื้อ

ความเชื่อผิด ๆ ...



โรคฝีดาษวานร (Mpox)



สวมถุงยางอนามัย

- ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ช่วยคุมกำเนิด



ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันโรคฝีดาษวานรได้

เพราะการสัมผัส
ซิดเนื้อแนบเนื้อ
เป็นช่องทางหลัก
ของการติดเชื้อ

กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง โรคฝีดาษวานร (Mpox)

- ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่/ขาดยาต้านไวรัส
- ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
- ผู้ป่วยมะเร็ง
- ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
- หญิงตั้งครรภ์/
ให้นมบุตร
- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี



พฤติกรรมเสี่ยง



โรคฝีดาษวานร (Mpox)



- มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ติดเชื้อ/คนไม่รู้จักร
- เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
- สัมผัสผิวหนังที่มีตุ่มพื่น/หนอง