



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ระวัง! ZIKA VIRUS

โรคติดต่อ
เชื้อไวรัสซิกา
หญิงตั้งครรภ์ต้อง
ป้องกัน อย่าให้ยุ่งลายกัด



ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ติดต่ออย่างไร

มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

1 ยุงลายตัวเมีย

เมื่อผสมพันธุ์แล้ว
จะต้องการเลือด เพื่อ
พัฒนาไข่และวางไข่
เพื่อแพร่พันธุ์



4 ยุงลายถ่ายทอดเชื้อ

ยุงลายที่มีเชื้อสามารถ
ถ่ายทอดเชื้อผ่านทางไข่ยุง
สู่รุ่นต่อไปได้

2 ยุงลายกัดผู้ป่วย

ยุงลายกัดผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
จะได้รับเชื้อไวรัสซิกา

3 ยุงลายที่มีเชื้อ

ยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกา
ไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะทำให้
คนติดเชื้อไวรัสซิกาได้



อาการ

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อาการ

- มีไข้
- ปวดศีรษะ
- ตาแดง
- ผื่นแดง
- ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- หากมีอาการ ให้รีบพบแพทย์



กลุ่มเสี่ยง

หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ ติดเชื้อไวรัสซิกา เสี่ยง การรกแรกเกิดศีรษะเล็ก พัฒนาการช้า



ป้องกัน กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ด้วยวิธี 3 เก็บ



เก็บ
บ้าน

ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



เก็บ
ขยะ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ทุกสัปดาห์



เก็บ
น้ำ

ปิดฝาให้มิดชิด
ภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs

- ✔ ยาแอสไพริน
- ✔ ยาไอบูโพรเฟน
- ✔ ยาโคโคฟีแนค
- ✔ ยาซุด

