

อาการโรคฝีดาษลิง

ระยะฟักตัว 7-21 วัน หลังได้รับเชื้อ
ขึ้นกับภูมิของแต่ละคนและปริมาณเชื้อที่ได้รับ

เริ่มจาก

มีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
ต่อมน้ำเหลืองโต

ลักษณะผื่น

อาจขึ้นบนใบหน้าหรือส่วนอื่นๆ
ของร่างกาย จากตุ่มแดงกลายเป็น
ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนองตกสะเก็ด
หรืออาจมีหลายแบบพร้อมกัน



การวินิจฉัยเฉื่อย และการรักษาโรคผื่นด่างสี

วินิจฉัยจาก

- ประวัติการสัมผัส
- อาการของผู้ป่วย
- ตรวจยืนยันเชื้อ โดยห้องปฏิบัติการ

การรักษา

- ในระยะแรก รักษาตัวที่โรงพยาบาล จนพ้นระยะแพร่เชื้อ รักษาตามอาการได้
- โรคนี้หายเองได้

แต่ก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

ระวัง! ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
เด็ก หญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มเสี่ยง



วิธีป้องกันโรคไข้ดำขลิง

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากอนามัย ช่วยลดการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยในระยะประชิดได้
- เลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของผู้ป่วย
- เลี่ยงการสัมผัสและมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยง
- เลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า



ล้างให้ถูกวิธี
อย่างน้อย
20 วินาที

